



CYFLON Solución Oftálmica


DESCRIPCIÓN:

Producto: CYFLON

Presentaciones: 5 mL

Principios Activos: Cyprofloxacin 0.3 %

Representados por su estructura química:



Nombre IUPAC: Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-quinolin-3-carboxílico

Categoría: Solución oftálmica estéril, antibiótico.

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibición tanto de la topoisomerasa de tipo II (ADN-girasa) como de la topoisomerasa de tipo IV, necesarias para la replicación, la transcripción, la reparación y la recombinación del ADN bacteriano.

bacteriana. Uso prolongado o repetido puede favorecer crecimiento de cepas no sensibles u hongos. Suspender al 1^{er} indicio de rash cutáneo. Se han notificado casos de hipersensibilidad grave (anafiláctica) en pacientes tratados con quinolonas (vía sistémica).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la ciprofloxacina o a otras quinolonas.

INSUFICIENCIA HEPÁTICA

Precaución en I.H. (falta de estudios).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

I.H. y I.R. (falta de estudios). No recomendado en neonatos con oftalmia neonatal, ni en niños < de 1 años (falta de experiencia). No utilizar si existen factores de riesgo para desarrollar infección ocular (uso de lentes de contacto, patología de superficie ocular, trauma o cirugía ocular). Riesgo de paso nasofaríngeo que puede contribuir a la aparición y difusión de resistencia

ISUFICIENCIA RENAL

Precaución en I.R. (falta de estudios).

EMBARAZO

No se dispone de resultados de ensayos clínicos controlados. Valorar riesgo/beneficio.



CYFLON Solución Oftálmica

LACTANCIA

La ciprofloxacina se excreta en la leche materna tras administración oral. Aunque se desconoce si tras administración oftálmica la ciprofloxacina se excreta en la leche materna, no se puede excluir que existe un riesgo para el niño lactante. Por ello se recomienda precaución cuando se administra esta solución oftálmica durante el periodo de lactancia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR

Después de la instilación, puede aparecer visión borrosa transitoria, que puede afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si aparecen estos efectos, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas.

REACCIONES ADVERSAS

Disgeusia; depósitos corneales, molestia ocular, hiperemia ocular.

