




**OFTICEL Solución Oftálmica**

**DESCRIPCIÓN:**

**Producto:** OFTICEL  
**Presentaciones:** 15 mL  
**Principios Activos:** Carboximetilcelulosa 0.5%

**Representados por su estructura química:**



**Otro Nombre:** Carmelosa

**Categoría:** Solución oftálmica estéril, lubricante ocular.

**INDICACIONES**

Para el alivio temporal de la molestia ocular, como sensación de ardor, irritación o incomodidad debida a los ojos resecos o al haberlos expuesto al viento o al sol. También se puede usar como protector contra una irritación posterior.

**FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS**

Ofticel es una solución transparente, lubricante con propiedades protectoras, útil para aliviar la molestia ocular como resequead del ojo, formando una película que protege a la conjuntiva y epitelio corneal de la irritación mecánica y la fricción de los párpados, facilitando la

regeneración de los tejidos lesionados. Ofticel brinda un alivio refrescante para los ojos secos o irritados por la semejanza de su composición con la de las lágrimas naturales. Ofticel contiene un agente conservador único suave y no sensibilizante. Ofticel puede usarse para el alivio prolongado de ojos resecos e irritados con la frecuencia que sea necesaria.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Si siente dolor en el (los) ojo(s), algún cambio en la visión, irritación o enrojecimiento continuo de los ojos, o si su condición empeora o persiste por más de 72 horas, suspenda el uso del producto y consulte a su médico.



**OFTICEL Solución Oftálmica**

**PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA**

No hay evidencias al respecto hasta el momento.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS**

No hay evidencias al respecto hasta el momento.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO**

No hay evidencias al respecto hasta el momento.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO**

No hay evidencias al respecto hasta el momento.

**PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD**

No hay evidencias al respecto hasta el momento.

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION**

Oftálmica.

Instilar una o dos gotas en el (los) ojo(s) afectado(s), según sea necesario.

**SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS)**

Con base en la inocuidad de los agentes activos, no existen riesgos de sobredosificación o por ingesta accidental.

**RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO**

Consérvese a una temperatura menor de 30 °C.

**LEYENDAS DE PROTECCION**

Para no contaminar el envase, no deje que la punta toque alguna superficie. Vuelva a cerrar el envase después de usar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Úsese solamente si los sellos impresos alrededor de la tapa y de las solapas interiores de la caja están intactos y claramente legibles. Si la solución cambia de color o se enturbia no la use. Si persisten las molestias consulte a su médico.

