




## PRESUSS Solución Oftálmica

### DESCRIPCIÓN:

<b>Producto:</b>	PRESUSS
<b>Presentaciones:</b>	2.5 mL
<b>Principios Activos:</b>	Latanoprost 0.005%

### Representados por su estructura química:



Nombre IUPAC: d- isopropilo ( Z ) -7 - [(1 R , 2 R , 3 R , 5 S ) -3,5-dihidroxi-2- [(3 R ) 3-hidroxi-5-fenilpentil] ciclopentil] hept-5- enoato

**Categoría:** Solución Oftálmica Estéril, antiglaucomatoso.

### INDICACIONES Y USO

Presuss Solución Oftálmica 0.005% está indicado para la reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.

### ESTUDIOS CLÍNICOS

Los pacientes con una media de la presión intraocular basal de 24-25 mmHg que fueron tratados durante 6 meses, demostraron reducción en la presión intraocular de 6-8 mmHg. Esta reducción de la PIO con Latanoprost al 0,005% dosificado una vez al

día era equivalente al efecto de Timolol 0.5% dosificado dos veces al día.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al Latanoprost o cualquier otro ingrediente de este producto.

### ADVERTENCIAS

Se han reportado cambios en los tejidos pigmentados. Más frecuentemente aumento de la pigmentación del iris, el tejido peri orbital (párpado) y pestañas, y el crecimiento de las pestañas. No se conocen los efectos del aumento de la pigmentación más allá de 5 años.



## **PRESUSS Solución Oftálmica**

### **PRECAUCIONES**

*General:* Latanoprost solución oftálmica 0.005% puede aumentar gradualmente la pigmentación del iris y la piel del párpado. El cambio de color del ojo se debe al aumento del contenido de melanina en los melanocitos del estroma del iris en lugar de a un aumento en el número de melanocitos.

Puede ocurrir cambio gradual en pestañas incluyendo aumento de longitud, el grosor, la pigmentación, el número de pestañas y el crecimiento de las pestañas mal dirigida. Los cambios en las pestañas son generalmente reversibles al suspender el tratamiento.

La Solución oftálmica de Latanoprost 0.005% debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de inflamación intraocular (iritis / uveítis) y no debe utilizarse en pacientes con inflamación intraocular activa.

Las lentes de contacto deben ser retirados antes de la administración de la solución oftálmica de Latanoprost 0.005%, y pueden volverse a colocar 15 minutos después de la administración.

### **Reacciones Adversas**

Cambios de pestañas (aumento de la longitud, grosor, pigmentación, y el número de pestañas); oscurecimiento de la piel de los párpados; inflamación intraocular (iritis / uveítis); cambios en la pigmentación del

iris; y el edema macular, incluyendo edema macular quístico.

